

1
Observation 1^e

1
Sur l'opération du paraphimosis
Envoyé à Monsieur Gevin par ch. F. Haxhe
chirurgien à Olne pres liege, terre des Etats généraux.

2
Le 18. du mois d'avril 1738, je fut
appelle pour un pauvre homme qui souffroit
depuis dix jours par le gonflement, l'inflammation,
l'ulcération dans les entre plis, et la douleur,
que cause ordinairement un paraphimosis
negligé

3
voiant des effets (2) si pressant, j'en fit
à l'instant pour ma première fois l'opération
comme j'étoit accoutumé de la voir faire
à l'hotel dieu de Paris, et comme des très
bons maître et auteurs nous l'enseignent

4
je debridai d'abord d'un côté sans succès
tous les bourslets du prepuce qui me paroiss-
oient former l'étranglement à la verge,
et pour obtenir le lendemain avec plus de
facilité la réduction, je lui appliquai
un cataplasme émollien qui n'opéra

ARC 50 n° 40



pas mieux qu'une seconde incision de l'autre
côté que je fus obligé de faire par la
persévérance des (2) des accidents, et parce-
que je crus qu'il falloit (3) débiter encore
mieux

5 mais inutilement, la partie étoit trop
gorgée et racornie pour pouvoir se vider
et devenir en état de renvelopper le glan,
en quoi; je n'usai; c'est que l'inflammation
se borna soit par l'application des catap-
lasmes soit par la suppuration qui s'établit
et qui dégorgea toutes la parties tumefiees

6 mais la maladie traina la cure et mes
peines à 35 jours de visites; c'étoit bien
assez pour me rebuter à pareille rencontre
d'un manœuvre si ennuyant et pour m'en-
gager à chercher quel qu'autre moyen
plus favorable.

car quelle suavité ne ~~peut~~ doit pas
goûter un chirurgien lorsqu'il peut guérir,
et faire passer tout à coup un pauvre

malade accablé de misere (2) et de douleur
 a la premiere douleur de son état de
 sante, les pauvres et les riches sont en
 droits de le demander, et ils le demandent
 dans un etas de compassion, donc un
 chirurgien charitable et sensible aux maux
 d'autrui se trouve incessamment dans la
 necessite de les satisfaire; en cas qu'ils
 puissent remplir ces obligations

2 observation (1)



8 Le 28 aout 1739 le sieur de de 26
 ans m'ayant mandé, me dit que depuis
 huit jours, qu'il souffroit, il se trouvoit
 actuellement et par degré réduit a ne
 pouvoir plus marcher, a cause d'une
 inflammation, et d'une extrême douleur
 qu'il avoit a la verge

9 je lui trouvoy un paraphimosis qui
 lui l'ordoit le glande côté, a cause

d'une grosse vespie diaphane et livant sur le rouge qu'il avoit a la partie lateral gauche ~~qui~~ du frin, et qui surpassoit le glan par la grosseur et longueur

10 jeu de la deference je ne m'informay pas
don ny comment ça (6) luiy estoit venu
l'effet existoit, et demandoit un juste secours

11 C'est dont a quoy je reus en luiy faisant
quatre ou cinq petites monchures de
lancette par cy, par la, dans (9) l'etendue de
cette eminence, pour faciliter aux humeurs
infilbre l'aisance d'en sortir; parce qu'elles
lenoit cette partie tendue au poin de rendre
la reduction impossible et affermissoit la
resistance et l'etirement qui est ordin-
-airement en dessus et au deffaut de la
chape du glan

12 il en sortit (10) d'abord de l'eau sanguinolente.
ensuite, en maniant, en pressant legerement
je n'en fit plus sortir qu'une eau limpide

13 enfin, le tout étant évacué et la (9)
partie étant devenue flasque et d'achille, je
tentai, et j'obtins la réduction de la manière
que nous verrons B. 21

14 je ne dois pas omettre que je ne fus pas
dix minutes pour accomplir cette manip-
-ulation (10-11-12) ou plutôt guérison, car
je ne me crus obligé d'exercer aucun ~~moyen~~
autre moyen pour contribuer à la guérison
des legeres (11) ouvertures que j'avoit fait

15 j'en fus certifié le lendemain par (7)
le sujet qui me dit qu'il se trouvoit
absolument guéri

16 je n'ai pas manqué du depuis de
profiter de cette aisance, (13) je l'ai pratiqué
constamment avec le même succès tant
sur les enfants que sur les adultes, et je
la continue jusqu'à ce que je connoisse
une méthode qui sache mieux me charmer



6

Troisième observation (1)

17 Le 10. de juillet 1751, j'en de plus
occasion de la pratiquer; mais un peu plus
difficilement sur un pauvre garçon de 18 ans;
dont les accidents étoit parvenus à un tel
état, que la partie du prepuce au dessus de
la verge et au dessus du gland étoit
demi-circulairement ulcérée; les rides +
ulcérées en étoit si dure si serré et si douloureux
qu'il paroissent inébranlable

18 par derrière et en dessous du côté du
frin, il y avoit comme trois vespies tendues,
et tirant sur le rouge; une à chaque
partie latéral du frin, et l'autre au milieu;
de sorte que le gland étoit presque caché
par l'étendue de ces vespies

19 je pointillai dans (18) le milieu sur
chaque deux coups de lancette; il en
sortit (12) de leau; mais voyant quelle
ne exprimeroit pas toute exactement toute

je repetaij encore quelque coups de point
dans les endroits ou on les dislingoit, et je
parvins de cette maniere a calvaire et
destruire absolument toute obstacle a la
reduction, je vit ceux sans lesquels il étoit
impossible d'operer la reduction

20 malgre (19) cette attention, j'en bien de
la peine (a cause de l'exulceration 17) d'achever
mon operation, l'aqueul ulceration qui se
montroit actuellement en dehors, devoit se
retroriller en dedans, et se cacher en
recouvrant le glan



21 je dus donc, et je fit un ferme effort
en tenant le prepuce pince d'un main
proche des bords de l'ulcère pour lui faire
faire la culbute, ce qui fut executé en
pressant de l'autre avec le pouce, le glan
et la coasistance des autres doigts qui man-
oeuvroit selonc qu'il pouvoit

22 ce manuel, fit souffrir le malade ;
mais la reduction lui fit goûter immédiatement

le bon et efficace de cette prompt guérison ;
car sans rien appliquer sur la partie ; je
lui ordonnay de me venir trouver le lendemain
pour lui donner quelque chose s'il sentoit
encore du mal, ce qu'il fit

23

je lui donnay un peu d'onguent napolitain
simple, et je lui montray de se le glisser
avec une plume tout autour entre le gland
et le prépuce pour adoucir et modifier (20)
cette ulcère ; 4 quatre jours après il me
fit dire par sa mere qu'il me faisoit remercier
qu'il ne sentoit plus rien

j'ajouteray cette dernière observation qui est
celle qui m'a fait naître (a) l'idée de ramasser
ces autres précédentes, ayant dans l'idée, que
dans des minutes la célèbre Académie de chirg.
peu y rencontrer quelque fois des pièces qui
peuvent trouver leur place de service

(a) sans ômettre que c'est pour satisfaire aux sollicitations
de la personne qui fait le sujet de cette observation, qui vouloit
que j'exaltasse cette méthode par quelque imprimé, mais je
sais trop bien, qu'elle n'est rien moins que nouvelle
ce que je peu m'en attribuer, c'est d'en être un zèle participant



- 24 un jeune gentil homme de 28 ans ayant eu pendant quatre jours un chatouillement très considérable au prépuce partie interne, dont il étoit obligé de faire jouer, ou frotter son cecce contre p le glan comme pour éviter de le grater
- 25 mais au bout (24) de ce temps le chatouillement étant devenu de plus en plus insupportable, il se trouva dans la nécessité de faire culbutter le dedans du prépuce en dehors en le faisant descendre par force en bas de la couronne
- 26 il reconnut alors (24-25) qu'il étoit lous parsemé de boutons plus ou moins ulcérés, qu'il médicamentas avec de la crème pendant deux jours; mais bientôt lous ces boutons se réunirent pour ne former plus qu'un ulcère très douloureux
- 27 C'est ici le moment que je fut appelé le 10 d'août 1751 parce qu'il vit bien que le naturel de cette maladie (26) prainnoit un mauvais train



28 Pour cela (24-25-26-27) connu, j'appliquay sur cette ulcere (26) au jour, pendant 28 heures sur de la charpie de l'ongan (23) pour reconnoître seulement si elle seroit traitable

29 en ayant reconnu de l'adoucissement, j'en entrepris l'opération a ma (21) maniere, et je forçay ainsi cruellement cette partie du propeul ulcere de rengainer le glan; tant parce qu'il pouvoit recevoir les memes secours (26) apres la reduction; que pour le sauver de la fureur des mauvais effit qui pouvoit en resulter et enfin pour le guérir vite; car dix jours apres, il n'étoit plus question d'ongan il ne sentoit plus rien

†
Coper-
ation

Reflexions

30 il est constant que l'opération (21) ne sauroit s'accomplir sans l'exacte precaution de donner le tems ~~aux~~ a l'évacuation des eaux, et ce n'est qu'a force de harpeler et de repeter les tentatifs de reduction, quelle sont forcées a se degorgere, en un mot je ne quitte point le malade, que le

glan ne soit recouvert, (comme nous avons dit vu depuis 22 jusqu'à 13, depuis 18 jusqu'à 21.)

31 je ne doute pas qu'il peu se rencontrer certain paraphimosis negligé, ou cette operation ne pourroit avoir lieu; comme lorsqu'ensuite d'une inflammation considerable ou bien d'une humeur virulente, les desordres sont parvenus jusqu'à former des ulcères larges, durs, et comme calleux.

32 il est sensé pour lors que notre (22-29) methode n'auroit pas toujours le même succès

33 mais en general nous devons observer que la cause qui fontente tant d'accidens proviennent du non retablissement de la chute du prepuce en bas de la couronne du glan; et que ce sont tous ces differentes desordres, (i. 2. 8. 9. 17-18.) qui par degre font obstacle plus ou moins a la reduction qu'il font plus ou moins grand et negligés.

34 or comme cest d'après les causes de maladies et de ces effets differents que nous devons varier



les moyens de guérir il est bon de déduire la
dessus nos idées

35 1^o Dans la plupart des hommes, il est avéré, que
dans l'état de mollesse de la verge; le prépuce
peut descendre avec aisance, et même bien plus
bas que la couronne, sans inconvénient,

36 2^o Dans les mêmes ~~part~~ (35) personnes, il est encore
certain que dans l'état d'érection de la verge;
les prépuces ne peuvent qu'à peine découvrir
en dessus la chape du gland, à cause de sa roideur
et grosseur

37 et nous avons lieu de croire que dans (35-36)
ces humeurs et naturels dispositions, la descente
du prépuce n'est nullement sujette aux symptômes
du paraphimosis (2-9-17) ~~à moins qu'il n'y ait~~

38 à moins qu'il n'y ait des ulcères formés à la
partie interne du prépuce qui embrasse le gland
qui pourroit le raidir, ~~retroffire~~ retreindre, et empê-
cher de se remettre dans son état naturel, lorsqu'il
en est dechut (25) par quelque effort.

39 alors ⁽⁴²⁾ étant abandonné à l'inconstance de l'air
ou à son mauvais sort, il perdra ce qu'il a dans

peu plus ou moins d'aigreur, de profondeur,
et par la suite d'un longue negligenee pourroit
attirer les accidens que nous avons vus 2.8.9.17

40 3° il peu se rencontrer d'autres sujet comme
il s'en trouve effectivement, qui dans les (35.36)
deux états de la verge, ont le prepuce tellement
etroit, que le glan n'en peut être decouffé
que par un plus ou moins grand effort

41 en (40) pareil cas, la chute du prepuce étant
fait; s'il n'est promptement réduit, il en peu
naître des accidens (2.6.17) quoiqu'il y ait la verge
existeroit dans l'état de mollesse

42 ce qui doit nous enseigner 1° que si le prepuce
et la verge au deffaut du glan, ne se trouvoient
pas mutuellement serré, il n'en pourroit
rien resulter en mal, 2° que la cause
premiere et unique du paraphimosis (dans une
disposition naturel et hureuse 37.) sera toujours
un effort plus ou moins grand qui devera
contraindre le prepuce a descendre, comme
nous avons vus, b 25, 3° que si dans ces deux
premier cas, la resistance se trouvoit trop



faible pour le contenir et fixer hors de son centre naturel, l'érection dans cette instant servira de cause adjoincte, qui de concert, ou separément et par degré, concourront a l'étranglement a l'accroissement et naissance de la douleur, de l'engorgement, de l'infiltration, de l'inflammation, de l'exulceration, et gangrene &c

- 43 nous resumons enfin qu'il faut donc faire des efforts contraires et plus ou moins grands pour finir cette opération, qu'il est 1° plus facile au commencement de la chute du prepuce; de faire la reduction avant l'érection, qu'après 2° qu'il est très difficile (même au commencement) de la faire pendant l'érection, mais pas tant impossible que lorsqu'il s'est amassé des eaux 3° lorsqu'il y a des eaux sans ulcere, pas tant que quand le paraphimosis est accompagné de tous le deax &c donc &c